

## 愛特淚單劑量眼用滴劑 0.32 % w/v

### Artelac Single Dose Unit Eye Drops

衛署藥輸字第 023228 號

#### 【成分】

**有效成分及含量：**每毫升含 Hypromellose (Hydroxypropylmethylcellulose) 3.2 mg

**其它成分(賦形劑)：**Sorbitol, Disodium phosphate dodecahydrate, Sodium dihydrogen phosphate dehydrate, Water for injection.

本藥是人工淚液，為單劑量使用的塑膠包裝，不含防腐劑，所以各單劑每支僅使用一次。

#### 【作用】

Hydroxypropylmethylcellulose (Hypromellose)是纖維醚的混合物，被用作為淚液的代替品和眼用潤滑劑。本藥是一滑潤的溶液，可濕潤眼睛和供給眼睛類似淚液的潤滑作用。Hypromellose 可增加溶液的稠度，具有濕潤作用和幫助保持溶液與眼睛接觸一段較長的時間。

#### 【用途(適應症)】

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

#### 【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

三、 其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 使用前，請洗淨雙手。

(四) 請依照藥品標示使用。

(五) 以下情形，請勿繼續使用。

1、 超過保存期限的眼藥水。

2、 藥液混濁、變色或出現異物時。

(六) 須於 24 小時內使用完畢，未使用完之溶液請勿繼續使用。

(七) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。

(八) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

1、 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。

2、 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。

#### 【用法用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

需要時使用	每次 1 至 2 滴。
-------	-------------

#### 【使用說明】

- 擦拭你的眼睛以清除殘留的水或流出物（眼屎）。
- 由標籤末端抓緊一支，從包裝移除一單劑。
- 扭轉此單劑之帽。
- 輕拉下眼瞼，然後小心滴 1-2 滴進入你的內側靠近鼻子的下眼瞼。
- 放開你的下眼瞼，眨幾次眼，以確保你的眼睛被液體覆蓋。
- 對另外一個眼睛重覆此過程。
- 將單劑之帽回蓋，於 24 小時內使用完畢。

當你使用本藥時，確定你知道如何使用，假如不知道，應請教藥師。

#### 【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

(一) 連續使用三天症狀沒有改善。

(二) 使用後產生眼睛劇痛，持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

(三) 若有任何不適情況產生。

【包裝】 200 瓶以下塑膠瓶盒裝（每瓶 0.6 毫升）。

製造廠： Dr. Gerhard Mann. Chem.-pharm. Fabrik GmbH

廠址： Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

藥商： 武昌貿易有限公司

地址： 台北市南京西路 13 號 8 樓

諮詢專線：(02)25219097